

## FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y MAGNESIO.

VECA PLUS MAGNESIO indicado para cultivos desarrollados sobre suelos ácidos y/o con altas fertilizaciones potásicas del suelo. VECA PLUS MAGNESIO participa en dos procesos importantes como la activación enzimática y estructura de la pared celular del fruto. VECA PLUS MAGNESIO formulado con extracto de algas, cuyos ingredientes activos se potencian en la mezcla para estimular procesos celulares claves, ayudando a la planta a una mejor absorción, transporte de nutrientes y aumentando su poder antioxidante, fotosíntesis.

APLICACIÓN

FOLIAR

Composición

p/v

Macrocystis Pyrifera

20,0%

Magnesio (Mg)

10,0%

AV  
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

## BENEFICIOS

Formatos



- Indispensable en el metabolismo del Nitrógeno.
- Evita o controla los desordenes fisiológicos por deficiencia nutricional.
- Interviene en el movimiento de los azúcares, ayudando a la fotosíntesis e influyendo en el desarrollo de raíces y frutos, y en la acumulación de reservas azucaradas.
- Participa en la síntesis de proteínas.
- La fotosíntesis es más eficiente, porque aporta más Magnesio a la molécula de clorofila.



## FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y MAGNESIO.

La deficiencia se manifiestan primero en las hojas más viejas, mostrando clorosis intervenal (amarillamiento entre las venas, mientras las venas permanecen verdes). Con el tiempo, aparecen manchas necróticas marrones y puntos amarillos difusos. La deficiencia prolongada dificulta la extracción de magnesio de las hojas viejas, lo que afecta su estructura y funcionalidad. Aunque en etapas iniciales no impacta severamente la floración, una deficiencia continua perjudica el desarrollo de flores y frutos. Suelos ácidos o arenosos, o un exceso de potasio o calcio, pueden agravar este problema.

### RECOMENDACIÓN DE USO

### DOSIS L/HA

<b>FRUTALES PERSISTENTES</b>	Aplicar a inicios de crecimiento de brote en primavera y repetir 20-30 días después. Con deficiencias aplicar durante el crecimiento de brotes en verano-otoño.	2-3 L
<b>FRUTALES CADUCOS</b>	Primera aplicación en caída de pétalos y repetir cada 5-7 días hasta completar de 3-4 aplicaciones. Aplicar en post-cosecha (30 días antes de caída de hoja).	2-3 L
<b>UVA DE MESA, VINÍFERA Y PISQUERA</b>	Inicio de aplicación con brote de 15-20 cm. Repetir de 3 a 5 aplicaciones durante la temporada desde baya cuajada hasta pinta. En Kiwi aplicar hasta inicio de floración.	2-3 L
<b>BERRIES</b>	Aplicar en brotación al follaje para activar fotosíntesis, repetir aplicaciones cada 15 días hasta completar de 4-5 aplicaciones.	2 L
<b>HORTALIZAS</b>	Aplicar de 10-15 días después del trasplante o emergencia, repetir cada 10-15 días.	2 L
<b>LEGUMINOSAS</b>	Aplicar desde los 25 a 40 días post-emergencia y repetir la aplicación 7-10 días después.	2 L

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

Para dudas o consultas contactar al encargado de su zona AgroVeca o con el departamento técnico de AGROVECA SPA  
[www.agroveca.cl](http://www.agroveca.cl)  
[www.agroveca.com.pe](http://www.agroveca.com.pe)  
 Formulado por AGROVECA SpA, Germán Riesco 302 Of. 326 - Rancagua, Sexta Región, [contacto@agroveca.cl](mailto:contacto@agroveca.cl)



SOLUCIONES SIN ESTRÉS