

VECA Plus CALCIO-BORO

FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS, CALCIO Y BORO.

VECA PLUS CALCIO-BORO está enriquecido con Boro (B) y Calcio (CaO), corrigiendo y/o previniendo desordenes fisiológicos. VECA PLUS CALCIO-BORO favorece la traslocación del Calcio en el metabolismo de los cultivos, permitiendo la llegada de este a ápices y frutos. VECA PLUS CALCIO-BORO contiene extracto de algas cuyos ingredientes activos se potencian en la mezcla para estimular procesos celulares claves, ayudando a la planta a una mejor absorción, transporte de nutrientes y aumentando su poder antioxidante, mejora la calidad de las pectinas y estabiliza paredes celulares del tubo polínico para ayudar a una mejor fecundación y cuaja.

APLICACIÓN

FOLIAR

Composición

p/v

Macrocystis Pyrifera

20,0%

Calcio (CaO)

20,0%

Boro (B)

2,0%

AV
SOLUCIONES SIN ESTRÉS


BENEFICIOS

Formatos



- Fuente de Calcio y Boro inmediata.
- Frutos más grandes y mayor firmeza.
- Mejora vida de post cosecha de frutas y hortalizas.
- Aumento del crecimiento radicular.
- Complejo Calcio-Boro ayuda a la estabilidad y flexibilidad de la pared celular.
- Ayuda a la adaptación de estrés abiótico.





Macrocystis pyrifera

FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS, CALCIO Y BORO.

La deficiencia de calcio se presenta en las plantas con necrosis en las puntas de las hojas jóvenes, deformación y encrespamiento, afectando también a los frutos con problemas como la pudrición apical en tomates o el bitter pit en manzanas. Además, causa un crecimiento atrofiado en raíces y una floración y fructificación deficientes.

La deficiencia de boro provoca necrosis en los meristemos apicales, malformación y fragilidad en hojas jóvenes, además de abortos florales y baja cuaja de frutos. También puede causar corazón hueco en tubérculos y raíz engrosada o acortada.

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS L/HA

FRUTALES PERSISTENTES	Primera aplicación en flor. Segunda aplicación en fruto cuajado y repetir 3 vueltas cada 7 días.	4-6 L
FRUTALES CADUCOS	Primera aplicación en flor. Segunda aplicación en fruto cuajado y repetir 3 vueltas cada 7 días.	4-6 L
UVA DE MESA, VINÍFERA Y PISQUERA	Primera aplicación en pre-flor para fortalecer la estructura del raquis. Segunda aplicación en bayas de 4-5 mm. Tercera aplicación repetir cada 5-7 días. En uvas sin semillas mezclar con los Giberélicos de crecimiento.	4-6 L
BERRIES	Primera aplicación en brotación. Segunda aplicación floración. Tercera aplicación fruto cuajado. Cuarta aplicación fruto en crecimiento *Se recomienda aplicar junto a VecaBalance 2L/ha.	4-6 L
HORTALIZAS	Aplicar de fruto recién cuajado cada 15 días para evitar necrosis apical hasta antes de cosecha.	4-6 L
LEGUMINOSAS	Aplicar a los 15-20 días de emergencia de la planta. Segunda aplicación en botón floral. Tercera aplicación en formación y/o crecimiento de las vainas, En algodón tercera aplicación en formación de cápsula.	4-6 L

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

Para dudas o consultas contactar al encargado de su zona AgroVeca o con el departamento técnico de AGROVECA SPA
www.agroveca.cl
www.agroveca.com.pe
Formulado por AGROVECA SpA. Germán Riesco 302 Of - 326 - Rancagua, Sexta Región. contacto@agroveca.cl

