

FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y CALCIO.

VECA PLUS CALCIO Formulado de una alta concentración en Calcio (Ca), que previene y corrige sus posibles deficiencias, en todos los tipos de cultivos. VECA PLUS CALCIO contiene extracto de algas cuyos ingredientes activos se potencian en la mezcla para estimular procesos celulares claves, ayudando a la planta a una mejor absorción, transporte de nutrientes y aumentando su poder antioxidante, entre otras.

APLICACIÓN

FOLIAR

Composición

p/v

Macrocystis Pyrifera

20,0%

Calcio (CaO)

20,0%

AV
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

BENEFICIOS

Formatos



- Fuente de CaO inmediata.
- Frutos más grandes.
- Mayor firmeza.
- Mejora vida de post cosecha de frutas y hortalizas.
- Forma parte estructural de la membrana y pared celular (Pectatos de Calcio).
- Cofactor de algunas enzimas, involucradas en la hidrólisis del ATP.
- Actúa como mensajero secundario en la regulación metabólica.
- Participa en el balance catión -anión en la vacuola.



FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y CALCIO.

Las deficiencias de calcio se observan en malformación de Hojas Nuevas, las hojas nuevas pueden aparecer pequeñas, distorsionadas, con bordes rizados o doblados. A menudo presentan necrosis en los bordes o puntas, que se oscurecen y se vuelven quebradizas. Raíces cortas y mal formadas: Las puntas de las raíces jóvenes pueden volverse marrones y necrosarse, afectando el desarrollo del sistema radicular. Los brotes jóvenes también pueden morir en sus extremos. Aunque menos común que en otras deficiencias, las hojas nuevas pueden mostrar un ligero amarillamiento (clorosis) en áreas específicas, acompañado de necrosis en casos severos.

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS L/HA

| | | |
|---|---|-------|
| FRUTALES PERSISTENTES | Primera aplicación en flor. Segunda aplicación en fruto cuajado y repetir 3 vueltas cada 7 días. | 4-6 L |
| FRUTALES CADUCOS | Primera aplicación en flor. Segunda aplicación en fruto cuajado y repetir 3 vueltas cada 7 días. | 4-6 L |
| UVA DE MESA, VINÍFERA Y PISQUERA | Primera aplicación en pre-flor para fortalecer la estructura del raquis. Segunda aplicación en bayas de 4-5 mm. Tercera aplicación repetir cada 5-7 días. En uvas sin semillas mezclar con los Giberélicos de crecimiento. | 4-6 L |
| BERRIES | Primera aplicación en brotación. Segunda aplicación floración. Tercera aplicación fruto cuajado. Cuarta aplicación fruto en crecimiento *Se recomienda aplicar junto a VecaBalance 2L/ha. | 4-6 L |
| HORTALIZAS | Primera aplicación en crecimiento vegetativo activo, repitiendo cada 7 días. Para apio y alcachofa aplicar cada 15 días desde el cubrimiento del 25% de cultivo, para corazón negro. | 4-6 L |
| CEREALES Y GRANOS | Primera aplicación en crecimiento vegetativo. Segunda aplicación en macolla. Tercera aplicación grano lechoso. | 4-6 L |