

VECA *Plus* MANGANESO

FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y MANGANESO.

VECA PLUS MANGANESO Concentrado a base de Manganeso y extracto de algas que proveen a la planta de suficientes niveles de reservas para que esta lo asimile y utilice según sus necesidades fisiológicas. VECA PLUS MANGANESO fue diseñado cuidadosamente para proporcionar a sus cultivos los beneficios tanto de las algas marinas como del manganeso, trabajando en conjunto para mejorar la salud y el crecimiento de las plantas.

APLICACIÓN

FOLIAR

Composición

p/v

Macrocystis Pyrifera

20,0%

Manganeso (Mn)

10,0%

AV 
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

BENEFICIOS

Formatos



- Promoverá el crecimiento vegetal al favorecer la división celular y la formación de tejidos.
- Esencial para la producción de clorofila, lo que aumentará la eficiencia de la fotosíntesis, por lo tanto, el rendimiento de la planta.
- Interviene en la síntesis de proteínas, mediante la asimilación del amonio.
- Aumenta la síntesis de fenoles, lignina y flavonoides, fortaleciendo a la planta.
- Mantiene la estructura laminar de los cloroplastos y regula el metabolismo de los ácidos grasos.
- Fomenta el alargamiento celular y promueve la formación de raíces laterales.
- El Mn está relacionado con la actividad de la enzima ácido indol acético oxidasa.





Macrocystis pyrifera

FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y MANGANESO.

La deficiencia de manganeso se presenta principalmente con clorosis intervenal, crecimiento deficiente y manchas necróticas. Aplicar productos a base de manganeso es esencial cuando aparecen estos síntomas, en suelos alcalinos o después de lluvias intensas. Su aplicación regular mejora la fotosíntesis, el crecimiento y la resistencia al estrés, asegurando una mayor productividad y salud en las plantas.

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS L/HA

FRUTALES PERSISTENTES	Aplicar en los flujos de crecimiento de otoño-primavera y repetir según necesidad de cultivo.	2-3 L
FRUTALES CADUCOS	Primera aplicación en botón floral. Segunda aplicación fruto cuajado, repetir cada 2 a 3 semanas hasta un mes antes de cosecha, Aplicar post cosecha antes de inicio de senescencia de hoja.	2-3 L
UVA DE MESA, VINÍFERA Y PISQUERA	Inicio de aplicación con brote de 15-20 cm. Repetir de 3 a 5 aplicaciones durante la temporada desde baya cuajada hasta pinta. En Kiwi aplicar hasta inicio de floración.	2-3 L
BERRIES	Aplicar de 1 a 2 veces, preferentemente antes de floración.	2 L
HORTALIZAS	Estados tempranos de desarrollo, con cubrimiento adecuado.	2-3 L
LEGUMINOSAS Y CEREALES	Aplicación a los 25-30 días post-emergencia, repetir según requerimiento del cultivo. Se recomienda una aplicación después de floración para mejorar calidad de grano y rendimiento.	2-2,5 L

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

Para dudas o consultas contactar al encargado de su zona AgroVeca o con el departamento técnico de AGROVECA SPA
www.agroveca.cl
www.agroveca.com.pe
Formulado por AGROVECA SpA. Germán Riesco 302 Of - 326 - Rancagua, Sexta Región. contacto@agroveca.cl

