

FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE. TRASLOCADOR DE RESERVAS.

VECA MOVE: Formulación especial que promueve una mayor tolerancia y eficiencia en los procesos fisiológicos demandantes de energía, como son el movimiento o traslocación de fotoasimilados a los órganos de reserva, aumento de sólidos solubles, color y lignificación. Contiene compuestos antioxidantes naturales que aumentan la funcionalidad y redistribución de los carbohidratos, manteniendo un flujo mucho más eficiente y prolongado a los órganos de reserva (raíz, yemas, frutos, etc.).

APLICACIÓN

FOLIAR

Composición	p/v
<i>Macrocystis Pyrifera</i>	25,0%
Manitol y L-Prolina	4,0%
Fósforo (P2O5)	15,0%
Potasio (K2O)	10,0%
Magnesio (MgO)	10,0%
Boro (B)	2,0%
Molibdeno (Mo)	0,1%



AV
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

BENEFICIOS

Formatos



- Aumenta coloración y sólidos solubles en vegetales y/o frutos.
- Promueve la activación de la planta frente a condiciones de estrés.
- Potencia el proceso de fabricación y acumulación de reservas.
- Aumento de la metabolización del Nitrógeno inorgánico a Nitrógeno orgánico.
- Promueve la redistribución de carbohidratos a los órganos de demanda.
- Promueve la lignificación de madera ayudando a la entrada en receso.



FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE. TRASLOCADOR DE RESERVAS.

VECA MOVE debe aplicarse en etapas clave como el llenado de frutos y maduración, promueve una eficiente traslocación de fotoasimilados hacia los órganos de reserva, mejorando el contenido de sólidos solubles y la calidad de los frutos. Además, es ideal para períodos de acumulación de reservas en raíces, yemas y tubérculos, favoreciendo un crecimiento vigoroso en la próxima temporada. En situaciones de estrés energético como sequías o heladas, VECA MOVE mejora la tolerancia de la planta y mantiene un flujo energético constante, fortaleciendo la estructura celular, mejorando la coloración del fruto y garantizando un mayor rendimiento.

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS L/HA

FRUTALES PERSISTENTES	Aplicar en quiebre de color, repetir a los 10-15 días.	5-6 L
FRUTALES CADUCOS	Aplicar 30 días antes de cosecha y repetir 15 días después En caducos se puede realizar otra aplicación a inicios de caída de hojas para favorecer la movilización de azúcares de reserva.	5-6 L
BERRIES	Aplicar en quiebre de color y repetir a los 10-15 días.	4-5 L
PAPAS	Aplicar a inicio de llenado de tubérculo y 30 días antes de cosecha.	4-5 L
HORTALIZAS DE FRUTO	Primera aplicación con un 30-50% flores abiertas.	4-5 L
UVA DE MESA, VINÍFERA Y PISQUERA	Aplicar en ablande generalizado y repetir a los 15 días.	5-6 L
LEGUMINOSAS	Aplicar en aparición de vainas y entre 15-20 días antes de cosecha.	3-4 L