

FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y HIERRO.

VECA PLUS HIERRO corrige deficiencias de hierro, cruciales para la respiración y fotosíntesis de las plantas. Las deficiencias, comunes en suelos calcáreos y alcalinos ($\text{pH} > 7,5$), provocan clorosis foliar, afectando primero a las hojas jóvenes. En frutales como manzano, peral y vid, se observa clorosis intervenal con venas verdes. VECA PLUS HIERRO contiene algas cuyos componentes activos, estimulan procesos fisiológicos a nivel celular, mejorando la asimilación, absorción y transporte de nutrientes.

APLICACIÓN

FOLIAR

Composición

p/v

Macrocystis Pyrifera

20,0%

Hierro (Fe)

5,0%


AV
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

BENEFICIOS

Formatos



- Cofactor de enzimas que catalizan reacciones bioquímicas indispensables en los procesos de fotosíntesis, respiración, metabolismo del nitrógeno y de los sulfatos.
 - Cumple un rol muy importante en la transferencia de electrones (reacciones de oxido reducción), proceso que forma parte de la Fotosíntesis.
 - Participa en la funcionalidad de enzimas antioxidantes, que evitan el daño celular.
- Participa de forma directa en los procesos de síntesis de clorofila, metabolismos de las proteínas y fijación biológica del nitrógeno.



Macrocystis pyrifera

FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y HIERRO.

El hierro debe aplicarse en primavera y verano o cuando se observen síntomas de deficiencia. Los principales signos incluyen: Clorosis férrica: Hojas jóvenes amarillas con venas verdes. Crecimiento reducido y hojas pequeñas. Menor producción de flores o frutos. Debilidad o marchitamiento general. Es recomendable aplicar hierro en suelos alcalinos o calcáreos, donde su absorción es limitada, preferentemente a través de aplicaciones foliares para corregir rápidamente la deficiencia.

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS L/HA

FRUTALES EN GENERAL

2 a 3 aplicaciones al año, cuando observe deficiencia.

4-6 L

CITRICOS

Aplicación al inicio del brote.
15 días de la primera aplicación.
Después de cosecha.

2-4 L

PALTOS

Aplicación al inicio del brote.
Al inicio del desarrollo del fruto.
Después de la cosecha.

2-4 L

VID

Al inicio del brotación.
Inicio del crecimiento de bayas.
Bayas de 10 mm.

2-3 L

HORTALIZAS

Desde 5 hojas verdaderas, repetir cada 15 días.

2-3 L

SOLANÁCEAS

20 días después del brote.
Antes del aporque.

2-3 L

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL

WWW.AGROVECA.CL



Para dudas o consultas contactar al encargado de su zona AgroVeca o con el departamento técnico de AGROVECA SPA
www.agroveca.cl
www.agroveca.com.pe
Formulado por AGROVECA SpA. Germán Riesco 302 Of - 326 - Rancagua, Sexta Región. contacto@agroveca.cl



SOLUCIONES SIN ESTRÉS